

# COMMUNIQUÉ CLINIQUE DU DIRECTEUR MÉDICAL

Centre intégré  
de santé et de  
services sociaux de  
la Montérégie-Centre

Québec

SPU MONTÉRÉGIE

## Points importants

- La présentation du Glucagon sera modifiée dans les prochaines semaines.
- Les dosages restent les mêmes, seule la reconstitution nécessitera une manipulation supplémentaire.
- Il est possible que certains secteurs soient épargnés par ce changement.
- L'équipement de pratique est disponible au Centre de formation ! N'hésitez pas !

## Changement de présentation au Glucagon

Collègues,

La présentation du Glucagon, comme nous le connaissons, sera modifiée dans les prochaines semaines.

Ainsi, la seringue préremplie de solvant cèdera sa place à un vial et il nous faudra effectuer une manipulation supplémentaire afin de reconstituer la médication.

En annexe, vous pourrez voir les instructions et la nouvelle présentation du produit qui se retrouvera dans nos trousse.

La bonne pratique lors de reconstitution demande à ce qu'une aiguille de 1 po soit utilisée pour le retrait du liquide dans le premier vial et l'injection dans celui contenant la pastille de Glucagon. Une fois la médication prélevée, il est recommandé de changer d'aiguille (1 po ou 1 ½ po) pour l'injection dans le vaste externe de la cuisse du patient, selon sa morphologie...

Il est possible que certaines régions de la Montérégie échappent à cette façon de faire, pour le moment. Il nous faudra donc être vigilants et connaître nos outils de travail.

## Pratique

Comme pour toutes préparations de médicaments, la pratique aidera à développer une dextérité certaine. N'hésitez pas à demander aux TAP-Instructeurs de vous superviser lors de votre prochaine visite au Centre de formation. Nous avons tout le matériel requis afin de pouvoir exécuter les techniques de façon sécuritaire et supervisée. Demandez-le!

Merci de votre habituelle collaboration.



Michel Demeo, TAPAQ

Pour le directeur médical régional,

Services préhospitaliers d'urgence de la Montérégie