

## Points importants

- Une nouvelle forme du médicament chlorhydrate de vardénafil (Levitra®) pour le traitement de la dysfonction érectile a été approuvée le 29 août dernier par Santé Canada. Il s'agit du Staxyn®.
- Le Staxyn® se dissout rapidement en quelques secondes sur la langue.
- Il est présenté dans un attrayant emballage coulissant noir format de poche qui contient quatre comprimés.
- Il faut valider l'utilisation du Staxyn® avant l'administration de nitroglycérine, selon les mêmes paramètres que le Levitra® (prise du médicament dans les dernières 24 heures).

l'administration de nitroglycérine, selon les mêmes paramètres que le Levitra® (prise du médicament dans les dernières 24 heures).

En terminant, nous vous rappelons que l'administration de nitroglycérine chez un patient ayant pris récemment des médicaments pour la dysfonction érectile peut causer une hypotension sévère, voire fatale. Soyez donc vigilants lors du questionnaire se rapportant aux contre-indications reliées à l'administration de la nitroglycérine.

## Nouveau médicament pour la dysfonction érectile : Staxyn®

Une nouvelle forme du médicament chlorhydrate de vardénafil (Levitra®) pour le traitement de la dysfonction érectile a été approuvée le 29 août dernier par Santé Canada. Il s'agit du Staxyn®, fabriqué par Bayer. Le Staxyn® contient 10 mg de chlorhydrate de vardénafil et est un médicament à dissolution orale. C'est un comprimé qui se dissout rapidement en quelques secondes sur la langue, dont le coût est à peu près deux fois moindre que celui de la plupart des médicaments contre la dysfonction érectile. L'effet dure jusqu'à huit heures. Le médicament est présenté dans un attrayant emballage coulissant noir format de poche qui contient quatre comprimés.

Vous risquez donc de le rencontrer sur la route. En attendant une consigne de la Direction médicale nationale amendant les PICTAP, il importera donc d'en valider l'utilisation avant




Figure 1 : Emballage du Staxyn®

Dave Ross, M.D.