

Points importants

- De nouveaux critères d'exclusion ont été adoptés pour l'administration de la nitroglycérine et ils doivent être appliqués immédiatement.
- Nous vous invitons à découper le résumé et à le coller dans votre guide poche.
- Un document présentant les raisons scientifiques supportant les changements est annexé à ce communiqué. Nous vous invitons à le lire, car il contient des informations médicales pertinentes à votre profession.

Nouveaux critères d'exclusion reliés à l'administration de la nitroglycérine

Dernièrement, la Table des directeurs médicaux régionaux des SPU a adopté de nouveaux critères d'exclusion pour l'administration de la nitroglycérine. Les lignes qui suivent vous présentent les critères d'inclusion (qui sont les mêmes) et les nouveaux critères d'exclusion.

Nitroglycérine

Critère d'inclusion (condition d'administration) :

Douleur thoracique d'origine cardiaque probable (DTCOP) chez un patient de 35 ans et plus ou chez le patient de moins de 35 ans avec antécédent de MCAS.

Critères d'exclusion (contre-indications) :

- Tension artérielle systolique < 100 mmHg;
- Chute cumulative de la tension artérielle systolique \geq 30 mmHg par rapport à la valeur initiale;
- Bradycardie < 50 ou tachycardie \geq 100 (pouls et fréquence cardiaque);
- Prise de médication pour la dysfonction érectile de PDE5 :
 - sildénafil (Viagra[®], Revatio[®]) < 24 heures;
 - vardenafil (Levitra[®], Staxyn[®]) < 24 heures;
 - tadalafil (Cialis[®]) < 48 heures;
 - autre, dont tout supplément naturel pouvant contenir du sildénafil, du vardenafil ou du tadalafil (fréquemment importé d'Asie);
- Grossesse/allaitement;
- Douleur d'origine traumatique;
- Allergies aux nitrates;
- AVC < 48 heures.

Ces critères d'exclusion doivent être appliqués immédiatement. Sur la page qui suit, vous trouverez le résumé des nouveaux critères pour la nitroglycérine que nous vous invitons à découper et à coller dans votre guide de poche, afin d'avoir ces derniers à portée de main au chevet du patient. Nous vous ferons parvenir sous peu un autocollant.

Également, le document ci-attaché que nous vous invitons à lire traite des raisons scientifiques qui ont poussé à ces changements dans les critères d'exclusion de la nitroglycérine. Toutes ces informations médicales sont pertinentes à votre profession.



Dave Ross, M.D.



Nitroglycérine

Critère d'inclusion (condition d'administration) :

Douleur thoracique d'origine cardiaque probable (DTOCP) chez un patient de 35 ans et plus ou chez le patient de moins de 35 ans avec antécédent de MCAS.

Critères d'exclusion (contre-indications) :

- Tension artérielle systolique < 100 mmHg
- Chute cumulative de la tension artérielle
- systolique \geq 30 mmHg par rapport à la valeur initiale
- Bradycardie < 50 ou tachycardie \geq 100 (pouls et fréquence cardiaque)
- Prise de médication pour la dysfonction érectile de PDE5 :
 - sildénafil (Viagra®, Revatio®) < 24 heures
 - vardenafil (Levitra®, Staxyn®) < 24 heures
 - tadalafil (Cialis®) < 48 heures
 - autre, dont tout supplément naturel pouvant contenir du sildénafil, du vardenafil ou du tadalafil (fréquemment importé d'Asie).
- Grossesse/allaitement
- Douleur d'origine traumatique
- Allergies aux nitrates
- AVC < 48 heures