

ANNEXE

Que faire si la transmission de l'ECG ne fonctionne pas ?

| SITUATION 1 : SI L'HÔPITAL DU BASSIN DE DESSERTE N'A PAS DE SERVICE D'HÉMODYNAMIE | | | |
|--|---|--|---|
| Hôpital du bassin de desserte vers lequel la télémétrie ne fonctionne pas | Télémétriser vers l'hôpital de support IPIM | Si IAMEST confirmé, se diriger vers : | Si IAMEST non confirmé, se diriger vers : |
| Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel | Hôpital Pierre-Boucher | Hôpital Pierre-Boucher | Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel |
| Hôpital Honoré-Mercier | | | Hôpital Honoré-Mercier |
| Hôpital Anna-Laberge | | | Hôpital Anna-Laberge |
| Hôpital du Haut-Richelieu | Hôpital Charles-Le Moyne | Hôpital Charles-Le Moyne | Hôpital du Haut-Richelieu |
| Hôpital Barrie Memorial | | | Hôpital Barrie Memorial |
| SITUATION 2 : SI L'HÔPITAL DU BASSIN DE DESSERTE A UN SERVICE D'HÉMODYNAMIE | | | |
| Hôpital vers lequel la télémétrie ne fonctionne pas est aussi un centre d'hémodynamie | Télémétriser vers l'hôpital de support IPIM | Si IAMEST confirmé, se diriger vers : | Si IAMEST non confirmé, se diriger vers : |
| Hôpital Pierre-Boucher | Hôpital Charles-Le Moyne | Hôpital Charles-Le Moyne | Hôpital Pierre-Boucher |
| Hôpital Charles-Le Moyne | Hôpital Pierre-Boucher | Hôpital Pierre-Boucher | Hôpital Charles-Le Moyne |
| SITUATION 3 : SI LE CENTRE D'HÉMODYNAMIE EST À L'EXTÉRIEUR DE LA MONTÉRÉGIE | | | |
| Hôpital vers lequel la télémétrie ne fonctionne pas pour lequel le centre d'hémodynamie est à l'extérieur de la région | Télémétriser vers l'hôpital de support IPIM | Si IAMEST confirmé, se diriger vers : | Si IAMEST non confirmé, se diriger vers : |
| Hôpital de Granby | Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | Selon le lieu de prise en charge : hôpital de l'Université de Sherbrooke ou Hôpital Charles-Le Moyne** | Hôpital de Granby |
| Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | Hôpital de Granby | | Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins |
| Hôpital du Suroît | Hôpital Anna-Laberge* | Hôpital Royal Victoria | Hôpital du Suroît |

* Le technicien ambulancier paramédic mentionne que le centre d'hémodynamie à mettre sous tension serait celui de l'hôpital Royal Victoria.

** Selon le lieu de prise en charge (ex : à l'ouest de Granby et Cowansville) les patients sont orientés en Montérégie vers l'hôpital Charles-Le Moyne.

SITUATION 4 : LA TÉLÉMÉTRIE N'EST PAS POSSIBLE POUR AUCUN HÔPITAL

| | Se diriger vers : |
|---|--------------------------------------|
| TOUS LES CRITÈRES SONT PRÉSENTS | Le centre d'hémodynamie le plus près |
| TOUS LES CRITÈRES NE SONT PAS PRÉSENTS | L'hôpital du bassin de desserte |

CRITÈRES

1. Interprétation informatique de l'ECG : IM aigu
2. Le centre d'hémodynamie peut être atteint dans un délai d'environ 45 minutes
3. Présence d'une douleur thoracique d'origine cardiaque probable lorsque l'ECG a été pris
4. Fréquence cardiaque sur l'ECG (et non au moniteur) < 120 / minute
5. L'ECG est de qualité (sans artefact important)
Patient stable (état de conscience à A et TAS à 100 mmHg et plus)