

Information sur les différents virus respiratoires Établissements de soins (hôpitaux et CHSLD)

Janvier 2019

Pathogène ¹	Période d'incubation ¹	Période de contagion ¹	Type de protection ²	Durée des précautions additionnelles ¹
Adénovirus	5 jours	Jusqu'à la disparition des symptômes	Gouttelettes*	Jusqu'à 5 jours après le début des symptômes ou jusqu'à 24 heures après la résolution des symptômes respiratoires selon la plus longue des deux éventualités
Bocavirus	Non établie		Gouttelettes*	
Coronavirus	4 jours		Gouttelettes*	
Entérovirus	5 jours		Pratiques de base*	
Influenza	3 jours		Gouttelettes-Contact	
Metapneumovirus humain	5 jours		Gouttelettes*	
Parainfluenza type 1 à 4	6 jours		Gouttelettes*	
Rhinovirus	3 jours		Pratiques de base*	
Virus respiratoire syncytial	8 jours		Gouttelettes-Contact	

*Unité de pédiatrie, de néonatalogie ou pour un usager immunodéprimé : il est recommandé de maintenir les précautions additionnelles contre la transmission par gouttelettes-contact.

Sources: ¹ Cinq, Mesures de prévention et de contrôle des virus respiratoires, incluant l'influenza, dans les milieux de soins: caractéristiques des agents infectieux. 2018.

² Cinq, Mesures de prévention et de contrôle des virus respiratoires, incluant l'influenza, dans les milieux de soins: cas sporadiques. 2018