



Offrir le service et le matériel nécessaire aux utilisateurs de drogues par injection



Qu'est-ce qu'un CAMI ?

Centre d'Accès au Matériel d'Injection 



Les CAMI permettent :




- De favoriser des comportements sécuritaires de consommation chez les usagers de drogues par injection
- De diminuer leurs risques de contracter des infections et autres complications
- De diminuer leurs risques de surdoses



Comment peut-on reconnaître un CAMI ?









Que contient la trousse noire?





Avant d'offrir une trousse

- Demander à la personne les substances qu'elle consommera
- Remettre la trousse d'injection qui lui convient
- Demander la quantité de trousse dont elle a besoin et lui remettre cette quantité





Rappeler aux usagers que
le matériel contenu dans
les troussees d'injection
est à usage unique.

Toujours offrir de la naloxone

- Référer la personne au pharmacien pour qu'il puisse lui expliquer la technique
- Toujours offrir un contenant de récupération



Communiquer ou référer vers les organismes en travail de rue

Organismes	Territoires couverts	Téléphone
Macadam Sud	Longueuil et grand Longueuil Saint-Hubert Brossard	450-677-9021, composez le 0
CIJM (Centre d'intervention-Jeunesse des Maskoutains)	Saint-Hyacinthe	450-773-4909
Maison des jeunes de Sorel	Sorel-Tracy	450-846-1283
1001 rues	Vallée du Richelieu St-Bruno de Montarville	514-349-4749 514-432-1326 514-926-7636 514-424-7185 (communautés ethnoculturelles) 514-919-4481 (50 ans et +) 514-234-2369 (50 ans et +)
POSA/Source des Monts	Chambly Marieville et environs Saint-Césaire et environs	450-658-9898 Chambly-Richelieu : poste 780 Saint-Césaire : poste 735
Passe-moi la puck	Saint-Jean-sur-Richelieu	438-403-8734 438-403-8019
Pacte de rue	Beauharnois Salaberry-de-Valleyfield Haut St-Laurent	450-370-2420, poste 2
L'Aiguillage	Vaudreuil-Soulanges	1-877-265-8460 1-877-373-1072 1-866-835-1776
Maison des jeunes Châtelois	Châteauguay Mercier Léry	514-825-0343 438-405-0387



Pour plus d'information, consulter la brochure suivante



<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2022/22-313-01F.pdf>



Pour devenir CAMI ou commander du matériel, veuillez communiquer avec :

- CISSS Montérégie-Centre : [Isabelle Aubry](#)
Courriel : isabelle.aubry.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-882-9195
- CISSS Montérégie-Ouest : [Kaelle Lapointe-Lévis](#)
Courriel : kaelle.lapointe-levis.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone (450) 801-1539
- CISSS Montérégie-Est : [Isabelle De Lierre](#)
Courriel : isabelle.delierre.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 450-502-2181

Elles vous expliqueront la procédure à suivre.



Vos répondantes régionales en santé publique :

Concernant les questions sur la naloxone :

Audrey Morin

Courriel: audrey.morin.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

Téléphone : 450-928-6777 poste 14054

Concernant le programme d'accès au matériel stérile d'injection :

Nancy Dionne

Courriel: nancy.dionne.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

Téléphone: 450-928-6777 poste 13643

Affiches imprimables pour les usagers

Administration de la naloxone par injection

POSSIBLE SURDOSE D'OPIOÏDES : QUOI FAIRE

La personne a pu consommer des drogues ou des médicaments et elle présente les signes suivants :

RECONNAÎTRE UNE POSSIBLE SURDOSE

Absence de réaction au bruit ou à la douleur / Respiration difficile, ronflante ou absente

La personne semble inconsciente

1 TENTEZ DE LA FAIRE RÉAGIR PAR LE BRUIT OU LA DOULEUR

CRIEZ son nom **PARLEZ-LUI** fort / **FROTTEZ** le centre de sa poitrine (sternum) avec force

Elle ne réagit pas

2 APPELEZ OU FAITES APPELER 911

SI VOUS ÊTES SEUL(E) ET SANS TÉLÉPHONE :

- Injectez une dose de naloxone
- Faites des compressions thoraciques pendant 2 min.
- Placez la personne sur le côté
- Allez appeler le 911 et suivez leurs instructions

Elle ne réagit pas

3 INJECTEZ UNE DOSE DE NALOXONE

Retirez le capot / Apprenez la naloxone / Injectez la naloxone dans le muscle de la cuisse ou de l'épaule (à 90°) / Cassez l'ampoule

Elle ne réagit pas

4 FAITES SANS TARDER DES COMPRESSIIONS THORACIQUES

FAITES 2 compressions par seconde de 5 cm de profondeur / **COMMENCEZ le RCR** si formé(e), en utilisant le masque barrière

Elle ne réagit pas 3 min. après l'injection

5 INJECTEZ UNE AUTRE DOSE DE NALOXONE

RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 4 ET 5 tant que la personne ne réagit pas / **1** Vous n'avez plus de naloxone? Continuez les compressions thoraciques ou le RCR jusqu'à l'arrivée des secours

SI LA PERSONNE SE RÉVEILLE...

Placez-la sur le côté ; expliquez-lui ce qui vient de se passer et priez-la de l'importance d'être vue par un professionnel de la santé. Après une semaine, les risques d'un réflexe une autre sont élevés car la naloxone agit seulement sur une courte période de temps. Demandez-lui de ne jamais consommer d'opioïdes dans les heures qui suivent pour éviter une autre surdose. Demandez-lui aussi d'attendre les secours. La loi sur les biens personnels apporte une protection pour les témoins ou victimes de surdoses.

1

- Conservez la naloxone à une température modérée et la protéger de la lumière
- Vérifier la date d'expiration
- Ne pas partager les serings à l'aiguille
- Injecter la naloxone à brèves des vêtements légers est possible
- Disposer des serings et des aiguilles usagées de façon sécuritaire

Québec

<https://bit.ly/2GuTc6B>



Administration de la naloxone par voie nasale

POSSIBLE SURDOSE D'OPIOÏDES : QUOI FAIRE

La personne a pu consommer des drogues ou des médicaments et elle présente les signes suivants :

RECONNAÎTRE UNE POSSIBLE SURDOSE

Absence de réaction au bruit ou à la douleur / Respiration difficile, ronflante ou absente

La personne semble inconsciente

1 TENTEZ DE LA FAIRE RÉAGIR PAR LE BRUIT OU LA DOULEUR

CRIEZ son nom **PARLEZ-LUI** fort / **FROTTEZ** le centre de sa poitrine (sternum) avec force

Elle ne réagit pas

2 APPELEZ OU FAITES APPELER 911

SI VOUS ÊTES SEUL(E) ET SANS TÉLÉPHONE :

- Administrez une dose de naloxone
- Faites des compressions thoraciques pendant 2 min.
- Placez la personne sur le côté
- Allez appeler le 911 et suivez leurs instructions

Elle ne réagit pas

3 ADMINISTREZ UNE DOSE DE NALOXONE

Prenez la personne ou le bébé / Prenez le vaporisateur / Prenez le bouton dans une main / Administrez la dose

Elle ne réagit pas

4 FAITES SANS TARDER DES COMPRESSIIONS THORACIQUES

FAITES 2 compressions par seconde de 5 cm de profondeur / **COMMENCEZ le RCR** si formé(e), en utilisant le masque barrière

Elle ne réagit pas 3 min. après l'administration

5 ADMINISTREZ UNE AUTRE DOSE DE NALOXONE DANS L'AUTRE NARINE

RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 4 ET 5 tant que la personne ne réagit pas / **1** Vous n'avez plus de naloxone? Continuez les compressions thoraciques ou le RCR jusqu'à l'arrivée des secours

SI LA PERSONNE SE RÉVEILLE...

Placez-la sur le côté ; expliquez-lui ce qui vient de se passer et priez-la de l'importance d'être vue par un professionnel de la santé. Après une semaine, les risques d'un réflexe une autre sont élevés car la naloxone agit seulement sur une courte période de temps. Demandez-lui de ne jamais consommer d'opioïdes dans les heures qui suivent pour éviter une autre surdose. Demandez-lui aussi d'attendre les secours. La loi sur les biens personnels apporte une protection pour les témoins ou victimes de surdoses.

1

- Conservez la naloxone à une température modérée et la protéger de la lumière
- Vérifier la date d'expiration
- Laisser le vaporisateur dans sa boîte jusqu'à son utilisation

Québec

<https://bit.ly/2PTY4vZ>



Références documentaires

Distribution de matériel d'injection neuf (MSSS) <https://bit.ly/3jSeGnM>

Autocollant CAMI (MSSS) <https://bit.ly/4135SfM>

Surdoses aux opioïdes (INSPQ) <https://bit.ly/3YDcNu2>

Chacun son kit, s'injecter à moindres risques (MSSS) <https://bit.ly/3HOHJkc>

Outil de sensibilisation pour les opioïdes (Gouv du Canada) <https://bit.ly/3lqpMAN>