

Trajectoire pour alternatives au Paxlovid en Montérégie

Directives/informations

1. Le Paxlovid est le premier choix. Si une interaction médicamenteuse est présente et se gère, c'est ce qu'il faut choisir comme option car notre capacité à administrer des alternatives IV est limitée.
2. Une évaluation pour une thérapie alternative IV peut être faite via le formulaire en pièce jointe (c'est sa SEULE utilité, ne peut pas servir à nous adresser des questions).
3. Nous allons évaluer seulement les patients immunosupprimés (peu importe le statut vaccinal) qui ne peuvent absolument pas recevoir le Paxlovid. Il s'agit d'une décision locale car nous n'avons pas la capacité de faire plus pour le moment.
4. Le formulaire, une fois complété sera transféré automatiquement à l'une des 3 équipes (CISSS Montérégie-Est, CISSS Montérégie-Ouest ou CISSS Montérégie-Centre) selon ce que vous allez cocher.
5. Ne pas compléter le formulaire et l'envoyer pour faire des tests svp. Nous l'aurons automatiquement.
6. Vous pouvez faire des demandes d'évaluation à tout moment mais nous vous rappellerons uniquement entre 9h et 16h. Donc assurez-vous de transmettre l'information à vos collègues quand vous faites une demande. Le formulaire est non nominatif pour le patient (seulement les initiales). Donc c'est certain que nous vous rappellerons pour discuter du cas et prendre la suite en charge.
7. Pour votre information, nous avons 2 alternatives IV au Paxlovid actuellement. Le sotrovimab qui se donne en une dose seulement mais que nous réservons aux patients avec une fonction rénale inférieure à 30ml/min. L'efficacité du sotrovimab est questionnée pour le variant BA.2, nous attendons la position de Santé Canada prochainement, donc pour le moment étant donné les inventaires limités, nous le donnons uniquement au patient qui n'ont pas d'autres alternatives IV. L'autre alternative est le remdesivir qui se donne sur 3 jours en 3 perfusions (J1-J2 et J3) mais le remdesivir ne se donne pas pour le moment quand la fonction rénale est inférieure à 30 ml/min.

Trajectoire pour alternatives au Paxlovid en Montérégie

<https://forms.office.com/r/k66hmg6t14>