

## LOI SUR LES BONS SAMARITAINS SECOURANT LES VICTIMES DE SURDOSES

### ✓ TU ES PROTÉGÉ MÊME SI :

- Tu es en possession de drogues pour ta consommation personnelle.
- Tu es gelé.
- Tu es témoin de la consommation de quelqu'un d'autre.
- Tu es en liberté provisoire, en ordonnance de probation, en ordonnance de sursis ou en en libération conditionnelle pour une accusation de possession simple.

### ✗ TU N'ES PAS PROTÉGÉ SI :

- Les policiers constatent que tu produis ou tu vends de la drogue.
- Tu commets un autre crime.
- Tu fais l'objet d'un mandat d'arrestation.
- Tu ne respectes par les conditions de liberté provisoire, d'une ordonnance de probation ou une liberté conditionnelle pour une accusation autre que la possession simple.

## TU AS BESOIN D'AIDE?

Aiguillage	450 218-6418
Centre de réadaptation en dépendance de la Montérégie	1 866 964-4413
Centre d'Intervention-Jeunesse des Maskoutains	450 768-4395
Émissaire	514 984-0030
Maison des jeunes Châtelois inc.	450 698-3343
Maison des jeunes de Sorel	450 742-1892
Macadam Sud	450 677-9021
Pacte de Rue	450 370-2420, p. 2
Posa Source des Monts	450 658-9898
1001 rues	514 349-4749

**Tu peux obtenir de la NALOXONE GRATUITEMENT  
auprès de ton : travailleur de rue – médecin – pharmacien.**

Québec 

Production : août 2021  
Direction de santé publique de la  
Montérégie, en collaboration avec des  
travailleurs de rue de la Montérégie

## TÉMOIN

### D'UNE SURDOSE?

Même si tu es gelé ou que tu as des drogues pour ta consommation personnelle, la **Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdoses** peut te protéger d'une accusation de possession simple.



Québec 

## Symptômes d'une surdose aux opioïdes



Peau froide et moite



Ronflements, étourdissements, confusion



Respiration lente, faible ou inexistante



Pupilles très petites



Lèvres ou ongles bleus




Incapacité à réveiller la personne

## Symptômes d'une surdose aux stimulants



Douleur à la poitrine et pouls rapide



Peau chaude, sueur



Hyperventilation



Agitation, confusion, anxiété



Convulsions



Inconscience

Tu penses que ton ami fait une surdose?  
**APPELE LE 911 ET DONNE DE LA NALOXONE.**



**1. Tenter de réveiller la personne.**



**2. Appeler le 911.**



**3. Placer dans une narine et appuyer sur le bouton.**



**4. Faites des compressions.**



**5. Si aucune réaction après 3 à 5 min, donner une autre dose dans l'autre narine. Faites des compressions.**