

Sentinelle

BULLETIN D'INFORMATION
EN MALADIES INFECTIEUSES

Direction de santé publique de la Montérégie
Volume 27, numéro 2 – Mai 2023 ISSN # 2369-2413

Nouveauté en vaccination: Programme contre le zona

Depuis le 1^{er} mai 2023, un programme de vaccination contre le zona sera offert au Québec. La vaccination sera maintenant gratuite pour les personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que les personnes immunodéprimées de 18 ans et plus. L'objectif du programme vise à diminuer les consultations et les hospitalisations dues au zona chez les groupes ciblés.

LE ZONA:

une maladie FRÉQUENTE

- 1 personne sur 3 souffrira du zona au cours de sa vie.
- 1 personne sur 2 âgée de ≥ 85 ans souffrira du zona.
- Les 2 principaux facteurs de risque sont :
 - l'âge avancé
 - l'immunodépression.




Zona ophtalmique

avec son lot de COMPLICATIONS

- Névralgie post-herpétique: 20% des cas de zona.
- Hospitalisations: 600/an au Québec.
- Décès: environ 10/an au Québec dont 80% affectent des personnes âgées de ≥ 80 ans.

Autres complications possibles

- Atteinte visuelle ou auditive
- Syndrome de Guillain-Barré
- AVC
- Surinfection bactérienne
- Méningo-encéphalite
- Paralyse faciale
- Pneumonie



Un vaccin qui a fait ses preuves!

Autorisé au Canada depuis 2017

Efficace:

Deux doses de vaccin Zona-SU induisent une très forte réponse immunitaire à long terme:

- efficacité de **84% à 97%** à 3 ans pour prévenir le zona.
- efficacité de **89%** contre la **névralgie post-herpétique**.

Sécuritaire:

- Les réactions locales et systémiques sont fréquentes mais transitoires.
- Le vaccin semble augmenter légèrement le risque de développer le syndrome de Guillain-Barré, mais ce risque est beaucoup plus élevé chez les personnes qui développent le zona.

Vaccin Zona-SU (Shingrix®)

- Vaccin inactivé
- Administration voie I/M
- Calendrier 2 doses



Le vaccin contre le zona: un sujet névralgique à discuter avec vos patients!


À RETENIR, la vaccination est

- Gratuite chez les personnes âgées de 80 ans et plus et celles immunodéprimées âgées de 18 ans et plus.
- Indiquée mais non-gratuite chez les personnes âgées de 50 à 79 ans et celles âgées de 18 ans à 49 ans présentant certaines maladies chroniques (voir [PIQ](#)).
- Requis indépendamment des antécédents de varicelle, de vaccination contre la varicelle ou de vaccination avec le vaccin Zona-VA (Zostavax®).

À ne pas oublier : mpox (variole simienne) et pneumocoque

La mpox (variole simienne) continue à sévir ici et dans le monde

En effet, [2 cas importés](#) ont récemment été signalés à Montréal chez des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH).



Le vaccin disponible au Canada, [Imvamune](#)[®] est très sécuritaire et requiert 2 doses. Avec l'augmentation des voyages et la reprise des événements festifs, **recommandez la vaccination à vos patients s'ils ont des comportements à risque.**

Indications en préexposition de Imvamune[®] pour les personnes âgées de 18 ans et plus

Les [hommes \(incluant les hommes trans\) et les personnes GBTQ ou non-binaires](#) qui ont, ou qui auront, des contacts sexuels avec un homme (incluant les hommes trans)

- autre qu'un partenaire sexuel unique régulier, OU
- dans un endroit (ou un événement) où peuvent avoir lieu des activités à caractère sexuel, OU
- en échange d'argent ou d'autre biens ou services (donnés ou reçus).

Les travailleurs, travailleuses et bénévoles dans un lieu de socialisation ou lors d'événements où peuvent avoir lieu des activités à caractère sexuel entre hommes (incluant les hommes trans).

Les travailleurs et travailleuses du sexe.

De plus, les voyageurs qui prévoient avoir ces mêmes comportements à risque à l'étranger doivent aussi être vaccinés. Voir le site de [l'Organisation mondiale de la santé \(OMS\)](#) pour les informations épidémiologiques par régions/pays.

Nouveau vaccin conjugué contre le pneumocoque [Pneu-C-20 \(Pevnar 20[®]\)](#)

- Gratuit pour les enfants et les adultes atteints d'asplénie (anatomique ou fonctionnelle) ou d'immunodépression.
- Pas nécessaire de recevoir le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque ([Pneu-P](#)), Pneumovax 23[®] par la suite.
- Votre patient a déjà reçu le vaccin Pneu-P ou un autre vaccin Pneu-C? Sauf exception, on devrait attendre 1 an avant de lui administrer le Pevnar 20[®].

Quel(s) vaccin(s) contre le pneumocoque sont à recommander pour vos patients? Consultez le PIQ, sections [Tableau synthèse des vaccins pneumocoque](#) et [Autres vaccins recommandés](#).



Où prendre rendez-vous pour vous faire vacciner? [Portail Clicsante.ca](#)

Les vaccins Zona-SU et Pneu-C-20 sont aussi disponibles dans plusieurs pharmacies et cliniques privées pour les indications non soutenues financièrement par le MSSS.



Se référer au [Protocole d'immunisation du Québec](#) pour plus d'informations sur les précautions et contre-indications à l'administration de ces vaccins.




Voir les avis du Comité sur l'immunisation du Québec (INSPQ) concernant le zona: [2018](#) et [2020](#)

Une réaction inhabituelle post-vaccination.....que faire?

- Déclarer une manifestation clinique inhabituelle, c'est contribuer à la surveillance de la sécurité vaccinale.
- Pour déclarer, vous n'avez pas à établir un lien de causalité avec la vaccination.
- Obligation légale pour tout professionnel de la santé, qu'il ait administré le vaccin ou non (art. 69 de la Loi sur la santé publique).

[Formulaire déclaration MCI](#) et [Guide d'utilisateur](#):

Télécopieur 450 928-3023 OU par courriel: mci.dspu.ciasssmc16@ssss.gouv.qc.ca

 Ce document peut être reproduit ou téléchargé pour une utilisation personnelle ou publique à des fins non commerciales, en mentionnant la source.

Rédactrices : D^{es} Madeleine Duclos, Alex-Anne Mathieu, Yen-Giang Bui et Véronique Thibault, CSI
Collaboratrice : Catherine Guimond, ASI

