



Sentinelle

Bulletin d'information

en maladies infectieuses et santé environnementale

Direction de santé publique de la Montérégie

Volume 27, numéro 7 – Décembre 2023 ISSN # 2369-2413

Infections transmissibles sexuellement et par le sang : les gestes clés!

Les infections transmissibles sexuellement et par le sang représentent toujours des menaces importantes en santé publique. Il est primordial de connaître les gestes clés pour prévenir ces infections et leurs conséquences. Voici un aperçu des interventions visant le **VIH**, le **VHC**, la **syphilis congénitale** et la **gonorrhée**.

La prophylaxie préexposition au VIH (PPrE): en prescrivez-vous assez ?

En plus des méthodes barrières, du traitement des personnes infectées et de la prophylaxie post-exposition (PPE), la **PPrE** est l'un des moyens reconnus efficaces pour prévenir le VIH. Elle est essentielle à maîtriser. (Voir la section formations en ligne au verso)

En présence de clientèles à risque, vous devez évaluer leur risque de contracter le VIH, envisager ou recommander la PPrE, prescrire les tests de dépistage et assurer le suivi médical nécessaire.

Clientèles chez qui la PPrE est indiquée :

PPrE indiquée

- HARSAH
- Femmes transgenres
- UDI
- Certains couples hétérosexuels

LES GESTES CLÉS → PRESCRIRE LA PPrE

Connaître la PPrE et la rendre disponible à toute personne à risque de contracter le VIH, selon le guide : [La PPrE VIH : Guide pour les professionnels de la santé du Québec](#)

HÉPATITE C, il faut s'en préoccuper!

En tant que menace pour la santé publique, l'hépatite C est ciblée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), par une [stratégie mondiale](#) visant à l'éliminer d'ici 2030.

LES GESTES CLÉS → BIEN ABORDER L'HÉPATITE C

DÉPISTER les personnes à risque selon les outils :

- [ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés](#)
- [Prélèvements et analyses recommandés chez une personne asymptomatique](#)



PRENDRE EN CHARGE et TRAITER l'infection selon le Guide pour les professionnels de la santé du Québec: [La prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de l'hépatite C.](#)

DÉCLARER le cas à la [Direction de santé publique de la Montérégie](#) (avec le stade et les informations sur la biovigilance)

La syphilis congénitale inquiète

L'augmentation soutenue du taux d'incidence de la syphilis infectieuse chez les femmes en âge de procréer¹ est préoccupante, notamment en raison du risque de transmission au nouveau-né.

2022

Syphilis congénitale

- Québec : 13
- Montérégie : 3

LES GESTES CLÉS → PRÉVENIR LA SYPHILIS CONGÉNITALE

DÉPISTER toute femme enceinte:

- au 1er trimestre ou lors de la 1ère visite prénatale.

REDÉPISTER, en présence de nouvelle exposition, de facteurs de risque ou comportement à risque de la femme enceinte ou du partenaire, minimalement :

- vers la 28e semaine de grossesse;
- lors de l'accouchement.

DÉPISTER toute femme en âge de procréer¹ :

- présentant des facteurs de risque;
- à sa demande.

Pour plus d'informations : [Appel à la vigilance - Augmentation de cas de syphilis congénitale.](#)

¹ Femme en âge de procréer : 15 à 49 ans

Portrait montréalais des ITSS : Consulter les [dernières données épidémiologiques](#)



Des questions?
1 800 265-6213

Québec

Résistance aux antibiotiques des souches de *Neisseria gonorrhoeae* : il faut des cultures!

En Montérégie comme au Québec, aucune souche résistante ou à sensibilité réduite à la céfixime ou à la ceftriaxone n'a été identifiée en 2022. Par ailleurs, les données montérégiennes démontrent que la résistance à l'azithromycine a atteint 45,2%, laissant entrevoir que cet antibiotique ne pourra éventuellement plus être utilisé, et qu'il ne restera que peu d'options de traitement.

Cependant, seulement un cas sur cinq a eu une analyse par culture. Ce faible nombre de cultures compromet le suivi des souches résistantes aux antibiotiques et des cas d'échecs au traitement.

LES GESTES CLÉS → TRAITER ET SUPPORTER LA SURVEILLANCE

- Effectuer une [culture](#) afin d'établir la sensibilité de la souche aux antibiotiques [lorsqu'indiqué](#).
- Suivre rigoureusement le [traitement](#)
- Procéder à un [test de contrôle](#) dans tous les cas de gonorrhée. Si le résultat est positif, il peut s'agir d'un échec au traitement.



Pour plus d'informations:

- [Sommaire des résultats d'antibiorésistance des souches de *Neisseria gonorrhoeae* au Québec](#)
- [Guide d'usage optimal infections non compliquées à *Chlamydia trachomatis* ou à *Neisseria gonorrhoeae*](#)

Ressources et outils

[SYPHILIS - Guide d'usage optimal \(GUO\) 2023 - Repérage, Diagnostic, Usage optimal des antibiotiques et suivi](#)

Devant la recrudescence soutenue du nombre de cas de syphilis au Québec, l'INESSS a revu son [GUO](#), intégrant les nouvelles lignes directrices et des enjeux soulevés par des cliniciens.

MISES À JOUR IMPORTANTES :

Présentation clinique :

- [Les stades de la maladie – voir page 2](#)
- La NEUROSYPHILIS peut survenir **à tous les stades**

Traitement :

La pénicilline G parentérale est le traitement de premier choix pour tous les stades. En présence d'antécédents de réaction allergique à la pénicilline, évaluer la possibilité d'une désensibilisation avant celle d'un traitement alternatif.

- [Traitement et antibiothérapie – pages 3 et 4](#)



Orientation en médecine spécialisée :

- [Les différentes situations – pages 5 et 6](#)

Formations en ligne

La PPrE par le PNMVH : Formations accréditées

- [Pour les médecins](#)
- [Pour les infirmières](#)



INSPQ / FMOQ : nouvelle formation médicale continue - ITSS
« [Ulcérations génitales – Méfiez-vous ! La grande imitatrice, la syphilis, est de retour](#) »

INSPQ : Nouvelle offre et revue des modalités pour les formations en ITSS. [INSPQ – Formations ITSS](#)

À retenir : Les gestes clés en ITSS



HÉPATITE C : Aidez vos patients à connaître leur statut. C'est la première étape vers l'élimination de cette maladie.

PPrE : Informer, dépister, envisager la PPrE et suivre les personnes à risque permet de freiner la transmission du VIH.

SYPHILIS CONGÉNITALE : Détecter, intervenir et traiter en temps opportun la femme enceinte ou en âge de procréer.

GONORRHÉE : Il faut des cultures! Votre rôle est important dans le suivi de l'évolution de la résistance aux antibiotiques.



Ce document peut être reproduit ou téléchargé pour une utilisation personnelle ou publique à des fins non commerciales, en mentionnant la source.