

En mars 2024, des cas de rage chez des mammifères terrestres ont été identifiés aux États-Unis près de la frontière canadienne. Notamment, deux ratons laveurs rabiques atteints de la variante de la rage du raton laveur ont été trouvés à Fairfax et Milton (Vermont), à 32 et 36 km de la frontière respectivement. Ceci indique la possibilité d'une progression du front épidémique de la rage du raton laveur jusqu'au sud du Québec. L'épandage d'appâts vaccinaux est planifié afin d'immuniser les animaux sauvages dans les secteurs à risque; des infos supplémentaires seront publiées sur la page [Québec.ca/rageduratonlaveur](https://quebec.ca/rageduratonlaveur). Lors de tout changement de l'épidémiologie de la rage terrestre, tel que la découverte de ces animaux rabiques, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) met rapidement à jour le niveau de risque de rage des secteurs géographiques touchés sur la [carte interactive](#).

VÉRIFIER LES MODIFICATIONS DES NIVEAUX DE RISQUE DE RAGE ANIMALE DU SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

- Neuf municipalités du sud-est de la Montérégie et plusieurs municipalités dans le sud-ouest de l'Estrie sont maintenant considérées des secteurs à **risque élevé** de rage terrestre à la suite de la découverte des ratons laveurs rabiques.
- Comme le front épidémique de rage pourrait évoluer rapidement, **il est essentiel de consulter, à chaque nouvelle situation, la [carte interactive](#) ou le [tableau](#)** du risque de présence de rage du secteur géographique d'où provient l'animal mordeur, et ce, **pour toutes les municipalités du Québec**.
- Rappelons que toutes les municipalités du Nunavik, des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nord-du-Québec demeurent à **risque élevé**, de même que certaines municipalités de la Côte-Nord et de l'est de l'Estrie.

UTILISER LA NOTION DE RISQUE DE RAGE DU SECTEUR GÉOGRAPHIQUE DANS LE BON CONTEXTE

- Utiliser l'[outil d'aide à la décision](#) pour la gestion des expositions à risque de rage chez vos patients, incluant les **indications de prophylaxie post-exposition**. Le point suivant précise le contexte:
- Considérer le niveau de risque du secteur géographique lorsqu'il y a une exposition significative à un gros rongeur sauvage (ex. marmotte, porc-épic), un lagomorphe sauvage (ex. lièvre, lapin sauvage) ou lors de certaines situations d'expositions à un mammifère domestique (ex. chien, chat, furet, chèvre, bovin).
- Considérer le niveau de risque du secteur dans certaines [situations où une analyse de carcasse de l'animal](#) est demandée.

ÉVALUER LE RISQUE DE TRANSMISSION DE LA RAGE CHEZ LA PERSONNE EXPOSÉE

- Partout au Québec, une exposition significative à un mammifère sauvage, incluant la chauve-souris, pose un risque de rage.
- Évaluer selon l'exposition significative, l'espèce, l'état de santé et le comportement de l'animal impliqué ([Outil d'aide à la décision](#)). Considérer le niveau de risque du secteur géographique lorsqu'approprié (voir ci-haut).
- Contacter la DSPu en cas de doute sur l'évaluation du risque ou la conduite à tenir ainsi que pour demander l'analyse d'un mammifère sauvage lorsque disponible. Pour ce faire, composer le 1-800-265-6213.

CONSULTER LES OUTILS CLINIQUES ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

- [Algorithme d'aide à la décision pour la PPE contre la rage](#), vaccin et immunoglobulines antirabiques, vaccin tétanos – PIQ;
- Extranet Montérégie: <https://extranet.santemonteregie.qc.ca/dspu/maladies-infectieuses/pci-communaute/#zoonoses>
- MSSS RAGE - professionnels: <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/rage/documentation/>
- Gouvernement du Québec - population : Québec.ca RAGE [Humains](#), [Animaux](#), [Ratons laveurs](#)

POUR DÉCLARER UNE MADO À LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE

Par **télécopieur** : Transmettre le formulaire de déclaration AS-770 au 450-928-3023.

S'il s'agit d'une urgence, par téléphone : 1-800-265-6213.

Ces numéros sont réservés aux professionnels de la santé et ne doivent pas être divulgués au public.