


Outil d'aide à l'évaluation clinique du statut COVID -19 / Influenza / VRS / SAG en secteur Hors Hospitalier Privé

USAGER SYMPTOMATIQUE ¹

- ✓ Mise en place des précautions additionnelles Gouttelettes Contact Oculaire.
- ✓ Procéder au test de dépistage (TDAR ou PCR).



Contact étroit

COVID-19 : Isoler et dépister :

- Usager partageant la même chambre qu'un usager COVID-19 +.
- Dépistage contact étroit J0 - J4 ou 5, isolement 5 jours, et surveillance des sx jusqu'à J7.

Influenza/VRS : Isoler mais ne pas dépister :

- Usager partageant la même chambre qu'un usager détecté.
- Contact direct avec des sécrétions respiratoires sans protections.
- Isoler les cas contact étroit, PAS de TEST DE DÉPISTAGE si absence de sx pendant 72h post contact.

Contact élargi

- Ne pas isoler, ne pas dépister.
- Surveillance des sx 7 jours.
- Exemples de contact élargi :
 - o Voisin de table, de loisirs ...
 - o Visite de proche présentant des sx ou déclaré positif (COVID, Inlu, VRS, SAG)

Lors d'isolement, mettre en place les mesures de prévention du déconditionnement.

Symptômes COVID -19 :

1 des symptômes suivants :

- Fièvre **gériatrique** ²
- Toux (nouvelle ou aggravé)
- Dyspnée, essoufflement
- Perte d'odorat, perte ou altération du goût
- Mal de gorge

2 des symptômes suivants :

- Fatigue intense
- Céphalée
- Perte d'appétit importante
- Diarrhées, douleurs abdominales
- Douleurs musculaires généralisées
- Nausées ou vomissements
- Congestion nasale, rhinorrhée

Symptômes d'infection respiratoire

(Influenza, VRS, SAG) :

Fièvre **gériatrique** ² soudaine ou aggravée ET toux **OU**

Fièvre **gériatrique** ² OU Toux ET au moins 1 des sx suivants :

- Maux de tête
- Maux de gorge
- Arthralgies, myalgie
- Prostration, fatigue extrême

Critères pour lever l'isolement :

- ✓ Amélioration du tableau clinique depuis 24h (excluant toux, anosmie, agueusie/dysgueusie résiduelle).
- ✓ Absence de **fièvre gériatrique** ² depuis 48h sans prise d'antipyrétiques.
- ✓ Pour le COVID-19 : Faire valider la fin d'isolement de l'usager par le médecin.

¹ Un usager ayant eu un épisode de COVID-19 reconnu dans les 60 jours et moins ne devrait pas être dépisté. S'il a été dépisté par erreur et que le résultat est un « FAIBLE ARN », l'avis médical est requis, quelle que soit la condition clinique de l'usager.

² La fièvre gériatrique (65 ans et plus) se définit par l'un ou l'autre des critères suivants (INESSS, 2020) : – Une prise de température supérieure à 37,8°C orale – Prise de température répétée supérieure à 37,2°C orale ou à 37,5°C rectale – Une prise de température (orale, tympanique, axillaire ou rectale) supérieure de 1,1°C à la température basale de la personne (prise précédemment par la même voie)