

Outil d'aide à l'évaluation clinique d'un cas suspect de gastro-entérite d'allure virale

Usager répondant à la définition d'un cas suspect

- ✓ Procéder au dépistage COVID-19
- ✓ Appliquer les précautions additionnelles Gouttelettes-Contact-Oculaire jusqu'à l'obtention du résultat du test

Contact étroit :

- Usager de même chambre ou partageant la même toilette
- Isolement avec les précautions additionnelles Gouttelettes-Contact

Résultat test COVID-19
NÉGATIF

Résultat COVID-19 POSITIF : se référer à l'outil d'aide de l'évaluation du statut COVID-19

Changer l'isolement pour Gouttelettes-Contact et à maintenir jusqu'à 48H après les derniers symptômes

Si besoin, se référer au médecin pour analyse complémentaire tel que dépistage de Norovirus ou C.Difficile selon évaluation clinique.

Critères pour lever l'isolement :

L'isolement est cessé 48h après la fin des symptômes et la désinfection de la chambre.

Définition d'un cas suspect : 1 des situations suivantes :

- Apparition soudaine en 24H d'au moins 2 épisodes de vomissements
- Apparition soudaine en 24 heures de 2 épisodes de selles molles (selles prenant la forme du contenant) ou liquide de plus de ce qui est considéré comme normal pour cet usager

ET

Au moins 1 des symptômes ou signes de gastroentérite suivant :

- Fièvre
- Céphalées (Maux de tête)
- Crampes/ Douleurs abdominales
- Nausées

ET

Absence d'autres facteurs causals :

- Laxatifs
- Effets indésirables de certains médicaments associés à des vomissements
- Poussées évolutive d'une maladie chronique (ex : Maladie de Crohn)
- Gavage