

# L'EXCLUSION EN MILIEU SCOLAIRE

## 1. Pourquoi l'exclusion en milieu scolaire?

Pour éviter la transmission d'une maladie infectieuse aux autres élèves ou aux membres du personnel.

## 2. Pourquoi est-il important de respecter la politique d'exclusion?

- Pour diminuer le nombre de personnes malades et favoriser un environnement qui facilite l'apprentissage.
- Pour protéger les personnes les plus à risque de complications.
- Pour offrir à votre enfant le meilleur environnement pour guérir.

## 3. Quand votre enfant devrait-il être retiré de l'école?

- Il a de la **fièvre** le matin à la maison ou il développe de la **fièvre** à l'école
- Il présente des symptômes pouvant suggérer une **maladie grave**.  
Par exemple :
  - Il a de la difficulté à respirer
  - Il est très faible et n'a pas d'énergie
  - Il est incapable de rester éveillé
- Son **état de santé** l'empêche de suivre les activités de groupe ou empêche la personne responsable de s'occuper des autres élèves.
- Il a eu 2 **vomissements** ou plus dans les dernières 24 heures.
- Il a de la **diarrhée** et présente une de ces conditions:
  - Il a l'âge d'aller à la toilette, mais il n'est pas capable de se retenir
  - Il y a du sang ou du mucus dans ses selles
  - Il a de la fièvre en plus de sa diarrhée
- Il a des **plaies** ou des **boutons avec du pus** qui ne peuvent pas être couverts par un pansement imperméable.
- Le **médecin** lui a recommandé de **rester à la maison**.



### Définition de la fièvre :

Enfant de 3 mois et plus :

- 38,5 °C et plus (rectum ou oreille)
- 38,0 °C et plus (bouche)
- 37,5 °C et plus (aisselle)

La température **par le rectum est plus fiable** chez les enfants de 5 ans et moins.



#### 4. Quelles maladies contagieuses nécessitent une exclusion?

| Maladie contagieuse   | Exclusion du milieu scolaire jusqu'à                        |
|---|---|
| Impétigo, scarlatine ou pharyngite à streptocoque du groupe A | 24 heures après le début de l'antibiotique                  |
| Hépatite A  | 7 jours après le début des symptômes                        |
| Oreillons   | 5 jours après le début du gonflement des glandes salivaires |
| Rougeole  | 4 jours après le début des rougeurs                         |
| Rubéole   | 7 jours après le début des rougeurs                         |
| Gale  | Lorsque le premier traitement a été complété                |
| Infection à E. coli   | La fin des symptômes  |

#### 5. Quelles maladies contagieuses ne nécessitent pas d'exclusion?

- Conjonctivite
- Coqueluche
- COVID-19
- Érythème infectieux (5e maladie)
- Influenza (grippe)
- Maladie pieds-mains-bouche
- Oxyures
- Pédiculose (poux)
- Teigne
- Varicelle

**Toutefois, si l'enfant présente un des critères de la section 3, il doit être retiré de l'école.**

**Cet outil ne remplace pas une consultation avec un professionnel de la santé.**

Si vous avez des inquiétudes ou des questions concernant l'état de santé de votre enfant, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé ou à contacter **Info-Santé au 811**.

Pour toute **urgence**, téléphonez au **911**.

La **vaccination** est le meilleur moyen de protection contre certaines maladies contagieuses.

Avoir reçu l'ensemble des vaccins recommandés est le meilleur moyen d'éviter les effets les plus graves des infections et de diminuer les risques qu'une maladie se propage.