

Surdoses aux opioïdes en Montérégie, 2025

Direction de la santé publique de la Montérégie

Portrait épidémiologique, Vol. 12 no 7

Août 2026 - ISSN: 2291-9058

Décès non intentionnels rapportés par le bureau du coroner

Baisse de décès en 2025

En Montérégie, 44 décès liés à une intoxication suspectée aux drogues, incluant les opioïdes, ont été rapportés par le bureau du coroner en 2025. Une baisse du nombre de décès est observée dans l'ensemble des groupes d'âge par rapport à 2024, à l'exception du groupe des 19 ans et moins (figure 1)¹.

Les hommes représentaient en 2025 près des deux tiers (66 %; 29/44) des décès. Bien que les hommes demeurent surreprésentés, la proportion de décès chez les femmes affiche une tendance à la hausse depuis 2023, passant de 19 % à 34 % en 2025. Cette augmentation ne traduit toutefois pas une hausse soutenue du nombre de décès chez les femmes, mais plutôt une diminution plus marquée des décès chez les hommes au cours de la même période.

Des résultats d'analyses toxicologiques étaient disponibles pour 42 des 44 décès rapportés. Des opioïdes et du fentanyl ont été détectés dans respectivement 26 % (11/42) et 7 % (3/42) des décès.

Le taux de mortalité parmi les surdoses aux opioïdes rapportées demeure nettement inférieur en 2025 à celui observé pour le reste du Québec, que la région de Montréal soit incluse ou non dans le calcul (figure 2).^{1,2}



Faits saillants pour 2025

- Les taux de mortalité et de visites à l'urgence attribuables à une possible intoxication aux opioïdes en Montérégie, continuent d'être inférieurs à ceux observés dans le reste du Québec.
- Les décès chez les 19 ans et moins sont en augmentation.
- Les hommes demeurent majoritaires parmi les décès, les visites à l'urgence et les signalements liés à une possible intoxication aux opioïdes.
- Des opioïdes, incluant du fentanyl et des nitazènes, continuent d'être détectés dans les surdoses signalées à la Direction régionale de santé publique.

Figure 1 – Nombre de décès suspectés où du fentanyl ou analogue, opioïde et autre substance psychoactive ont été détectés, selon le groupe d'âge, Montérégie, 2022 à 2025





Figure 2 – Taux de mortalité due à une intoxication suspectée aux drogues dont les analyses toxicologiques ont détecté la présence d'opioïdes, Montérégie et reste du Québec, 2022 à 2025



Visites à l'urgence pour une intoxication possiblement causée par des opioïdes

Baisse de visites à l'urgence en 2025

En 2025, 110 personnes se sont présentées à l'urgence à la suite d'une intoxication possiblement causée par des opioïdes, comparativement à une moyenne annuelle de 142 personnes pour la période 2022-2024. Les personnes âgées de 50 à 64 ans représentaient la proportion la plus élevée des cas (30 %; 33/110). Les groupes d'âge de 20 à 34 ans et de 35 à 49 ans suivaient, chacun regroupant 25 % des cas (27/110). En 2025, les hommes et les femmes représentaient chacun 50 % des personnes touchées (55/110), alors que de 2022 à 2024, les hommes étaient majoritaires, en comptant pour 62 % des cas (266/427).

De 2022 à 2025, le taux d'incidence des visites à l'urgence pour une intoxication possiblement liée aux opioïdes est demeuré inférieur en Montérégie à celui observé dans l'ensemble du Québec. Cette différence n'est toutefois plus significative lorsque la région de Montréal est exclue du calcul (figure 3) ^{2,3}. Bien que la Montérégie Est affiche le taux le plus élevé du territoire, aucune différence statistiquement significative n'est observée entre les taux d'incidence des régions Ouest, Centre et Est.

Signalements retenus de surdoses présumées aux opioïdes

Baisse de signalements en 2025

La Direction de santé publique de la Montérégie a reçu 289 signalements de surdoses aux opioïdes survenues entre les années CDC 2022 et 2025⁴. Parmi ceux-ci, 72 surdoses présumées ont eu lieu en 2025, dont 62 retenues pour analyse.

Les services policiers ont signalé 73 % (45/62) de ces surdoses. Cette proportion est comparable aux années antérieures. Pour 66 % (41/62) des signalements, de la naloxone a été administrée afin de contrer les effets de la surdose, par rapport à 62 % (113/183) pour la période de 2022 à 2024. Les surdoses signalées en 2025, continuent de survenir majoritairement dans des résidences privées (53 %; 33/62) et touchent principalement les hommes qui représentent 69 % des cas (43/62), une tendance similaire aux années précédentes (figure 4)⁴.

Une diminution de la proportion de décès est observée parmi les cas retenus en 2025 (6 %; 4/62), comparativement à la période de 2022 à 2024, où cette proportion s'élevait à 19 % (35/183).

Figure 3 – Taux d'incidence des visites à l'urgence pour une intoxication possiblement causée par des opioïdes (diagnostic principal). Montérégie et reste du Québec. 2022 à 2025





Figure 4 – Nombre de signalements de surdose retenus, selon l'année et le genre, Montérégie, 2022 à 2025



Comme pour les années passées, les signalements en 2025 sont plus fréquents chez les 20 à 49 ans (69 %; 43/62) (figure 5)⁴. La moyenne d'âge des cas retenus est de 33 ans⁵.

En 2025, des résultats de laboratoire ont été reçus pour 40 des 62 cas retenus (65 %). La catégorie de substances la plus souvent retrouvée demeure celle des stimulants (85 %; 34/40) (figure 6)⁶. Du fentanyl ou des nitazènes ont été retrouvés dans 82 % (14/17) des échantillons contenant des opioïdes en 2025, de façon similaire à la période 2022-2024 (80 %; 51/64).

Figure 5 – Nombre de signalements de surdose retenus, selon l'année et le groupe d'âge, Montérégie, 2022 à 2025





Figure 6 – Catégories de substances retrouvées lors de l'analyse toxicologique, Montérégie, 2022 à 2025



Sources :

- ¹ Bureau du coroner, extraction de l'Infocentre de santé publique du 15 juin 2026 selon l'année civile de signalement. Les données sont basées sur les données d'enquêtes préliminaires du coroner. Les décès ne sont pas nécessairement causés par les drogues identifiées.
- ² Les symboles (+) indiquent que le taux brut est significativement supérieur à celui de la Montérégie, au seuil de 5 %.
- ³ MSSS, Système d'information de gestion des départements d'urgence, extraction de l'Infocentre de santé publique du 15 juin 2026.
- ⁴ Direction de santé publique de la Montérégie, fichier régional des signalements de surdoses aux opioïdes, extraction du 15 juin 2026 selon l'année CDC de la surdose. Les semaines CDC sont du dimanche au samedi. Puisque la semaine 1 ne débute pas nécessairement le 1^{er} janvier, certains cas peuvent être attribués à une autre année CDC que l'année réelle de surdose.
- ⁵ La date de naissance est inconnue pour un signalement retenu en 2025.
- ⁶ Centre de toxicologie du Québec (CTQ), Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML), extraction de l'Infocentre de santé publique du 15 juin 2026 selon l'année CDC de la surdose.

Note : La photo de l'en-tête a été générée avec Microsoft Copilot (IA), août 2026.



Ce document peut être reproduit ou téléchargé pour une utilisation personnelle ou publique à des fins non commerciales, à condition d'en mentionner la source.

- Auteurs :** Nardin Rezk, Agente de planification, de programmation et de recherche
Stéphane Godbout, Agent de planification, de programmation et de recherche
- Collaboration :** Isabelle Tardif, Personne-ressource en encadrement clinique
Mélanie Shang, Conseillère en soins infirmiers
Léonarda Da Silva, Technicienne en recherche psychosociale
- Mise en page :** Awa Gachili Nansi, Agente administrative